

**Preparación intestinal por la tarde con 4 litros de polietilenglicol****Marca comercial: TriLyte, Nulytely, Golytely**

- **Debe acompañarlo un amigo o familiar, quien será el encargado de conducir y de llevarlo hasta su casa. NO le daremos el alta si se retira en taxi, autobús u otro servicio de transporte sin la compañía de una persona responsable. No podrá conducir hasta el día siguiente del procedimiento.**

**Instrucciones especiales sobre medicamentos**

- Si está tomando un **anticoagulante**, nuestra enfermera se comunicará con usted para darle instrucciones después de haberse comunicado con el médico que le recetó el medicamento. Si la enfermera no se ha comunicado con usted 1 semana antes del procedimiento, llame a nuestra oficina.
- No tome **suplementos de hierro** durante **una semana antes** de la fecha del procedimiento. Sí puede tomar multivitaminas.
- **Pacientes diabéticos:** \_\_\_\_\_
- No deben tomar **diuréticos** (Lasix [furosemida], HCTZ [hidroclorotiazida], Dyazide, Diovan HCT, espironolactona), el día del procedimiento.
- **Sí pueden tomar medicamentos para el corazón, tensión arterial, tiroides, convulsiones o ansiedad el día del procedimiento** con un sorbo de agua.
- **Deben suspender el Effexor un día antes** del procedimiento (si corresponde).
- Los **pacientes asmáticos** deben traer sus **INHALADORES** el día del procedimiento.

**EL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO**

**NOTA IMPORTANTE:** Siga las instrucciones a continuación, pero **NO** las instrucciones del paquete de la preparación.

- **Puede desayunar liviano hasta las 11:00 a.m.**  
(por ejemplo: huevos revueltos, tostada de pan blanco, jugo de naranja, pero **NO** puede ingerir cereales integrales ni de otro tipo, avena, etc.).
- **NO PUEDE INGERIR ALIMENTOS SÓLIDOS DESPUÉS DE LAS 11:00 a.m.; SOLO LÍQUIDOS TRANSPARENTES.**
- Tome todos sus medicamentos habituales, **a menos que se le haya indicado lo contrario.**
- Prepare la solución de **NuLyte** a la mañana con agua tibia hasta la línea indicada y agregue un paquete de sabor. **Agite bien y enfríe.**
- **A las 6 p.m.:**  Sí  No Tome 2 comprimidos de Bisacodyl laxante con agua **2 horas** antes de la primera dosis de la preparación.
- **A las 8 p.m.:** Tome la mitad (64 onzas) de la preparación, 8 onzas cada 10 a 15 minutos.
- Es mejor tomar cada vaso rápidamente que de a sorbos. Tomar la solución con un sorbete también puede mejorar su tolerancia a esta preparación intestinal.

**DÍA DEL PROCEDIMIENTO**

- Tome la segunda dosis de la preparación **seis (6) horas** antes de dirigirse al centro donde se le realizará la endoscopia.  
*Por ejemplo, si piensa salir a las 12:00 p.m., debe tomar la segunda mitad a las 6:00 a.m.*
- **Tome** la segunda dosis de la preparación, 8 onzas cada 10 a 15 minutos.
- **DEBE** tomar toda la preparación 4 horas antes de llegar.

**PUEDE BEBER LÍQUIDOS TRANSPARENTES HASTA 4 HORAS ANTES DE LLEGAR, PERO LUEGO NO PODRÁ BEBER MÁS LÍQUIDOS.**

Para realizar preguntas generales o reprogramar el procedimiento, llame al 610-431-3122.