

Preparación intestinal por la mañana con MoviPrep

- **Debe acompañarlo un amigo o familiar para conducir y llevarlo hasta su casa. NO le daremos el alta si se retira en taxi, autobús u otro servicio de transporte sin la compañía de una persona responsable. No podrá conducir hasta el día siguiente del procedimiento.**

Instrucciones especiales sobre medicamentos

- Si está tomando un **anticoagulante**, nuestra enfermera se comunicará con usted para darle instrucciones después de haberse contactado con el médico que le recetó el medicamento. Si la enfermera no se ha comunicado 1 semana antes del procedimiento, llame a nuestras oficinas.
- **No tome suplementos de hierro durante una semana antes** de la fecha del procedimiento. Puede tomar multivitaminas.
- **Los pacientes diabéticos:** _____
- **No deben tomar diuréticos** (Lasix (furosemida), HCTZ (hidroclorotiazida), Diazida, Diovan HCT, espironolactona) el día del procedimiento.
- **Pueden tomar medicamentos para el corazón/tensión arterial/tiroides/convulsiones/nervios el día del procedimiento** con un sorbo de agua.
- **Deben suspender el Effexor un día antes** del procedimiento (si corresponde).
- **Los pacientes con asma** deben traer sus **INHALADORES** el día del procedimiento.

EL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO

NOTA IMPORTANTE: Siga las instrucciones de más abajo, y **NO** las instrucciones del paquete de la preparación.

- **NO COMA ALIMENTOS SÓLIDOS. SOLO PUEDE BEBER LÍQUIDOS TRANSPARENTES.**
- Tome todos sus medicamentos habituales, **a menos que se le haya indicado lo contrario.**
- Prepare la solución de **MoviPrep** en la mañana. Vierta un sobre A y un sobre B en el contenedor desechable. Agregue agua tibia hasta la línea superior del contenedor. Mezcle para disolverlo y luego enfríe.
- **A las 4 p.m.:** Sí No Tome 2 comprimidos de Bisacodyl laxante con agua **2** horas antes de la primera dosis de la preparación.
- **A las 6 p.m.:** **Tome** la primera dosis de la preparación; el envase de MoviPrep está dividido en 4 marcas. Cada 15 minutos, tome la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente **8 onzas**) hasta consumir toda la solución.
- **Luego** beba 16 onzas de líquido transparente durante las 2 horas siguientes.
- Prepare la segunda solución de MoviPrep como se mencionó anteriormente y enfríela hasta que deba tomar la dosis siguiente.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- **Tome la segunda dosis de la preparación seis (6) horas** antes de dirigirse al centro donde le realizarán la endoscopia.
Por ejemplo, si piensa salir a las 9:00 a.m., debe tomar la segunda dosis a las 3:00 a.m.
- **Tome** la segunda dosis de la preparación; el envase de MoviPrep está dividido en 4 marcas. Cada 15 minutos, tome la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente **8 onzas**) hasta consumir toda la solución.
- **Luego** beba 16 onzas de líquido transparente durante las 2 horas siguientes.
- **DEBE** tomar toda la solución 4 horas antes de llegar.

PUEDE BEBER LÍQUIDOS TRANSPARENTES HASTA 4 HORAS ANTES DE LLEGAR, LUEGO YA NO PODRÁ BEBER MÁS LÍQUIDO.

Para preguntas generales o reprogramar el procedimiento, llame al 610-431-3122.