

**Preparación intestinal por la mañana con Suprep**

- **Debe acompañarlo un amigo o familiar, quien será el encargado de conducir y de llevarlo hasta su casa. NO le daremos el alta si se retira en taxi, autobús u otro servicio de transporte sin la compañía de una persona responsable. No podrá conducir hasta el día siguiente del procedimiento.**

**Instrucciones especiales sobre medicamentos**

- Si está tomando un **anticoagulante**, nuestra enfermera se comunicará con usted para darle instrucciones después de haberse contactado con el médico que le recetó el medicamento. Si la enfermera no se ha comunicado una semana antes del procedimiento, llame a nuestra oficina.
- **No tome suplementos de hierro durante una semana antes** de la fecha del procedimiento. Sí puede tomar multivitaminas.
- **Los pacientes diabéticos:** \_\_\_\_\_
- **No** deben tomar **diuréticos** (Lasix [furosemida], HCTZ [hidroclorotiazida], Dyazide, Diovan HCT, espironolactona), el día del procedimiento.
- **Sí pueden** tomar **medicamentos para el corazón, tensión arterial, tiroides, convulsiones o ansiedad el día del procedimiento** con un sorbo de agua.
- **Deben suspender el Effexor un día antes** del procedimiento (si corresponde).
- Los **pacientes asmáticos** deben traer sus **INHALADORES** el día del procedimiento.

**EL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO**

**NOTA IMPORTANTE: Siga las instrucciones a continuación, pero NO las instrucciones del paquete de la preparación.**

- **NO INGIERA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO. SOLO PUEDE BEBER LÍQUIDOS TRANSPARENTES.**
- Tome todos sus medicamentos habituales, **a menos que se le haya indicado lo contrario.**
- **A las 4 p.m.:**  Sí  No Tome 2 comprimidos de Bisacodyl laxante con agua **2** horas antes de la primera dosis de la preparación.
- **A las 6 p.m.:** Vierta una (1) botella de 6 onzas de **Suprep** líquido en el recipiente para mezclar.  
Agregue agua potable fría hasta la marca de 16 onzas del recipiente y mezcle.
- Comience a tomar la solución **Suprep**. Tome todo el líquido del recipiente.
- **DEBE** tomar dos (2) recipientes más de 16 onzas de líquido transparente durante las 2 horas siguientes.

**DÍA DEL PROCEDIMIENTO**

- Tome la segunda dosis de la preparación **seis (6) horas** antes de dirigirse al centro donde se le realizará la endoscopia.  
*Por ejemplo, si piensa salir a las 9:00 a.m., debe tomar la segunda dosis a las 3:00 a.m.*
- Vierta una (1) botella de 6 onzas de **Suprep** líquido en el recipiente para mezclar.  
Agregue agua potable fría hasta la marca de 16 onzas del recipiente y mezcle.
- Tome todo el líquido del recipiente.
- **DEBE** tomar dos (2) recipientes más de 16 onzas de líquidos transparentes durante las 2 horas siguientes.
- **DEBE** tomar toda la preparación 4 horas antes de llegar.

**PUEDE BEBER LÍQUIDOS TRANSPARENTES HASTA 4 HORAS ANTES DE LLEGAR, PERO LUEGO NO PODRÁ BEBER MÁS LÍQUIDOS.**

Para realizar preguntas generales o reprogramar el procedimiento, llame al 610-431-3122.